

Листок-вкладиш, що додається до упаковки: інформація для пацієнта

ВІНПОВЕН, 5 мг, таблетки **ВІНПОВЕН ФОРТЕ, 10 мг таблетки** *Вінпоцетин*

Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати препарат, оскільки він містить важливу для пацієнта інформацію.

- Зберігайте цей листок-вкладиш, можливо, вам необхідно буде прочитати його ще раз.
- У разі сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта.
- Цей препарат був призначений конкретній людині. Його не слід передавати іншим. Препарат може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо симптоми у них однакові.
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, не зазначені в цьому листку-вкладці, слід повідомити про це лікаря або фармацевта.
Див. п. 4.

Зміст листка-вкладиша:

1. Що таке препарат Вінповен/Вінповен Форте і для чого він використовується
2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Вінповен/Вінповен Форте
3. Як використовувати Вінповен/Вінповен Форте
4. Можливі побічні дії
5. Як зберігати препарат Вінповен/Вінповен Форте
6. Вміст упаковки та інша інформація

1. Що таке препарат Вінповен/Вінповен Форте і для чого він використовується

Вінповен/Вінповен Форте містить діючу речовину вінпоцетин.

Вінпоцетин – речовина, що використовується для лікування захворювань або полегшення симптомів, пов'язаних із порушенням кровообігу в мозку.

Показання до застосування препарату Вінповен/Вінповен Форте:

- лікування хронічної недостатності церебрального кровообігу, включаючи стани після ішемічного інсульту та судинну деменцію;
- полегшення психічної та неврологічної симптоматики недостатності мозкового кровообігу;
- лікування судинних розладів слуху.

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Вінповен/Вінповен Форте

Коли не можна використовувати препарат Вінповен/Вінповен Форте :

- якщо у пацієнта алергія на вінпоцетин або будь-які інші інгредієнти цього препарату (перелічені в пункті б);
- якщо ви вагітні або годуйте груддю;
- якщо ви страждаєте на певні серцеві захворювання, тобто важку ішемічну хворобу серця та порушення серцевого ритму;
- в гострій фазі геморагічного інсульту;
- дітям,

Попередження та запобіжні заходи

Перед використанням препарату Вінповен/Вінповен Форте проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом.

Якщо у вас є певні захворювання серця, ваш лікар призначить проведення ЕКГ-перевірок (електрокардіологія – дослідження функції серця). В основному це стосується пацієнтів із

синдромом подовженого інтервалу QT або пацієнтів, які одночасно приймають ліки, що викликають подовження інтервалу QT.

Діти та підлітки

Цей препарат не призначений для застосування у дітей. Препарат не слід застосовувати через відсутність достатніх даних клінічних досліджень у цій віковій групі.

Препарат Вінповен/Вінповен Форте та інші лікарські засоби

Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі препарати, які пацієнт приймає зараз або приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.

Будь ласка, повідомте свого лікаря, якщо ви приймаєте будь-які з наступних ліків:

- альфа-метилдопа (ліки від високого кров'яного тиску);
- антикоагулянти (препарати, що знижують згортання крові);
- антиаритмічні засоби (препарати при порушенні серцевого ритму);
- глібенкламід (лікарський засіб від цукрового діабету);
- препарати, що діють на центральну нервову систему.

Вінповен/Вінповен Форте з їжею та напоями

Препарат слід приймати після їжі.

Вагітність і годування груддю

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, припускає, що може бути вагітною або планує мати дитину, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей препарат.

Вінповен/Вінповен Форте протипоказаний під час вагітності та годування груддю.

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів

Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та експлуатувати механізми.

Вінповен/Вінповен Форте в комплекті моногідрат лактози

Якщо у пацієнта діагностовано непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем перед прийомом препарату.

3. Як використовувати Вінповен/Вінповен Форте

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як сказав вам лікар. У разі сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта.

Рекомендоване дозування

Звичайна доза Вінповен становить 1 або 2 таблетки (5-10 мг) тричі на добу (15-30 мг/добу).

Підтримуюча доза: 1 таблетка 3 рази на день.

Звичайна доза Вінповен Форте становить ½-1 таблетку (5-10 мг) тричі на добу (15-30 мг/добу).

Підтримуюча доза: ½ таблетки 3 рази на день

Таблетки слід приймати після їжі.

Застосування Вінповен/Вінповен Форте пацієнтам з порушенням функції нирок та/або печінки

Пацієнтам з порушенням функції нирок або печінки корекція дози не потрібна.

Застосування Вінповен/Вінповен Форте у пацієнтів літнього віку

У пацієнтів літнього віку корекція дози не потрібна.

Прийом більше рекомендованої дози препарату Вінповен/Вінповен Форте

Якщо ви прийняли більше рекомендованої дози препарату, негайно зверніться до лікаря або фармацевта.

Пропуск прийому препарату Вінповен/Вінповен Форте

Не приймайте подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. Прийміть наступну дозу в звичайний час.

4. Можливі побічні дії

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не у всіх.

Побічні ефекти групуються за частотою виникнення наступним чином:

<i>дуже часто:</i>	трапляється у більш ніж 1 із 10 пацієнтів
<i>часто:</i>	трапляється рідше, ніж у 1 з 10 осіб
<i>нечасто:</i>	трапляється рідше, ніж у 1 з 100 осіб
<i>рідко</i>	трапляється рідше, ніж у 1 з 1000 осіб
<i>дуже рідко:</i>	трапляється рідше, ніж у 1 з 10000 осіб

Нечасті:

порушення сну (безсоння, сонливість), запаморочення та головний біль, слабкість. Ці симптоми можуть бути пов'язані з основним захворюванням;

зміни запису ЕКГ (депресія сегмента ST, подовження інтервалу QT), тахікардія та додаткове скорочення серця;

зміни артеріального тиску (переважно зниження артеріального тиску), припливи до голови;

нудота, печія і сухість у роті;
підвищення рівня печінкових ферментів;
шкірні алергічні реакції.

Рідко:

лейкопенія (зниження кількості лейкоцитів);
біль живота

Повідомлення про побічні ефекти

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, не зазначені в цьому листку-вкладці, слід повідомити про це лікаря, фармацевта або медичну сестру. Про побічні ефекти можна повідомити безпосередньо у Відділ моніторингу побічних дій лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних препаратів

Ал. Єрозолімські 181С

02-222 Варшава

Тел.: 22 49-21-301

Факс.: 22 49-21-309

Веб-сайт: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального суб'єкта.

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку застосування цього препарату.

5. Як зберігати Вінповен/Вінповен Форте

Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці.
Не використовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на картонній упаковці та блістері після: „EXP”. Термін придатності означає останній день вказаного місяця.
Особливих інструкцій щодо зберігання препарату немає.
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла.
Лікарські засоби не слід викидати у каналізацію або контейнери для побутових відходів.
Запитайте фармацевта, як утилізувати лікарські засоби, які більше не потрібні. Така поведінка допоможе захистити навколишнє середовище.

6. Вміст упаковки та інша інформація

Що містить Вінповен/Вінповен Форте

Одна таблетка Вінповен містить 5 мг діючої речовини.
Одна таблетка Вінповен Форте містить 10 мг діючої речовини.

- Діюча речовина препарату – вінпоцетин.
- Допоміжні речовини: лактози моногідрат, кукурудзяний крохмаль, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат.

Як виглядає препарат Вінповен/Вінповен Форте та вміст упаковки

Вінповен, довгасті двоопуклі таблетки від білого до майже білого кольору.
Довгасті двоопуклі таблетки від білого до світло-кремового кольору з лінією поділу на одному боці. Таблетку можна розділити на рівні дози.

Упаковка Вінповен містить 50, 100 або 200 таблеток.
Упаковка Вінповен Форте містить 30, 60, 90 або 180 таблеток.

Відповідальний суб'єкт та виробник

Polfarmex S.A.
вул. Юзефув 9
99-300 Кутно
Польща (Poland)
Тел.: 24 357 44 44
Факс: 24 357 45 45
e-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Дата останнього оновлення листка-вкладишу: