

KARTA OSTRZEGAWCZA DLA PACJENTA ABAGAT

- Opiekun lub pacjent powinien nosić kartę zawsze przy sobie
- Należy upewnić się, że jest to ostatnia wersja karty ostrzegawczej dla pacjenta

[21.09.2022]

Polfarmex S.A.

Szanowny Pacjencie.

Lekarz zalecił stosowanie leku ABAGAT (eteksylanu dabigatranu). Aby bezpiecznie stosować lek ABAGAT, należy zapoznać się z istotnymi informacjami w ulotce dla pacjenta. Karta zawiera ważne informacje dotyczące leczenia, należy nosić ją zawsze przy sobie. Należy informować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu leku ABAGAT.

ABAGAT Informacje dla pacjentów

W czasie stosowania leku ABAGAT stosuj się do instrukcji i zaleceń lekarza prowadzącego.

- Lek ABAGAT rozrzedza krew. Jest stosowany w leczeniu istniejących zakrzepów krwi lub w zapobieganiu tworzeniu się niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Przyjmowanie leku ABAGAT może zwiększać ryzyko krwawienia. Należy natychmiast zwrócić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów krwawienia, takich jak: obrzęk, uczucie dyskomfortu, nietypowy ból lub ból głowy, zawroty głowy, błądź, osłabienie, nietypowe zasinienie, krwotoki z nosa, krwawienie z dziąseł, nietypowe długie krwawienie z miejsca skaleczenia, nieprawidłowe krwawienie miesięczkowe lub krwawienie z pochwy, obecność krwi w moczu, który może być koloru różowego lub brązowego, czerwone / czarne stolce, kaszel z krwią, wymioty krwawe lub fusowate.
- W razie upadku lub urazu, zwłaszcza urazu głowy, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza po poradę.
- Nie należy przerywać podawania leku ABAGAT bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem w przypadku zgagi, nudności, wymiotów, uczucia dyskomfortu w żołądku, wzdęć lub bólu w nadbrzuszu.
- Ząywjaj lek ABAGAT regularnie, staraj się nie pomijać zaleconych dawek.
- Poinformuj lekarza o wszystkich innych lekach, które stosujesz lub planujesz zastosować.

- ABAGAT może być zażywany z lub bez posiłkiem. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody, w celu ułatwienia przedostania się do żołądka. Nie należy ich łamać, rozgryzać oraz nie wolno zażywać samych granulek ponieważ może to zwiększyć ryzyko krwawienia.
- Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku ABAGAT przed wszelkimi zabiegami chirurgicznymi / procedurami inwazyjnymi.

ABAGAT - informacje dla fachowego personelu medycznego

- Lek ABAGAT to doustny lek przeciwzakrzepowy (bezpośredni inhibitor trombiny).
- Może zaistnieć konieczność odstawienia leku ABAGAT odpowiednio wcześniej przed zabiegami chirurgicznymi lub innymi procedurami inwazyjnymi (więcej szczegółów znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego).
- W przypadku poważnego krwawienia lek ABAGAT należy odstawić natychmiast.
- Lek ABAGAT jest wydalany głównie przez nerki; konieczne jest picie odpowiedniej ilości płynów. Lek ABAGAT może być usuwany w drodze dializy. Patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego.
- Specyficzne antidotum dla dabigatranu jest znane i dostępne (Praxbind, idarucizumab). Patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego ABAGAT.

Należy wypełnić tę część lub zwrócić się do lekarza prowadzącego z prośbą o jej wypełnienie.

Dane pacjenta

Imię i nazwisko pacjenta

Data urodzenia

Wskazanie do leczenia przeciwzakrzepowego

Dawka leku ABAGAT